

Rivaroxabán (Xarelto)

El rivaroxabán (Xarelto®) es un medicamento que previene la formación de coágulos en la sangre. Se conoce como anticoagulante o “diluyente de la sangre”. En realidad, el rivaroxabán no diluye la sangre. Previene la formación de nuevos coágulos o que los coágulos existentes se vuelvan más grandes y provoquen problemas más graves.

*Tome
rivaroxabán
exactamente
como se le
recetó, a la
misma hora
todos los días.*

El rivaroxabán no disuelve los coágulos que ya se han formado. Se utiliza para prevenir o tratar la coagulación dañina relacionada con algunas afecciones de los vasos sanguíneos, o del corazón y los pulmones.

Dosificación y administración

Su médico o farmacéutico selecciona la dosis correcta de rivaroxabán dependiendo de su edad, peso y qué tan bien funcionan sus riñones, así como otros medicamentos que usted toma.

Debe tomar las tabletas de rivaroxabán con comida para dejar que su cuerpo lo absorba.

Tome rivaroxabán **exactamente como se le recetó**, a la misma hora todos los días. No deje de tomar rivaroxabán a menos que su médico se lo indique.

No se quede sin rivaroxabán. Surta nuevamente su receta antes de que se le acabe. Los efectos del rivaroxabán que combaten los coágulos comienzan a dejar de tener efecto en más o menos 24 horas.

Olvido de una dosis

Si olvidó tomar una dosis de rivaroxabán, tómela tan pronto lo recuerde, a menos que esté cerca de su próxima dosis.

- Si toma rivaroxabán una vez al día y han pasado más de 12 horas desde que tomó su dosis, omita la dosis que olvidó y espere para tomar la siguiente dosis programada.
- Si toma rivaroxabán dos veces al día y han pasado más de 6 horas desde que tomó su dosis, omita la dosis que olvidó y espere para tomar la siguiente dosis programada.

De esa manera evitará tomar una dosis doble o adicional. Luego, vuelva a su dosis regular programada.

Alcohol

No consuma alcohol mientras toma rivaroxabán. Consumir alcohol puede aumentar el riesgo de sangrado en su estómago e intestinos.

Interacciones entre medicamentos y productos herbales

Algunos medicamentos de venta libre (OTC, en inglés) sin receta médica pueden aumentar o disminuir el efecto del rivaroxabán. Es importante que hable con su médico o farmacéutico antes de usar aspirina u otros medicamentos para el dolor conocidos como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, en inglés). Cuando compre un analgésico, lea siempre los ingredientes de la etiqueta y pida la asesoría de su médico, enfermero o farmacéutico si no está seguro de su contenido. Para la mayoría de los pacientes, acetaminofén (Tylenol®) es el analgésico de venta libre preferente.

No use los siguientes medicamentos de venta libre comunes:

Medicamentos que contienen Aspirina	Antiinflamatorios no esteroideos
▪ Excedrin®	▪ Ibuprofeno (Advil®, Midol®)
▪ Anacin®	▪ Naproxeno (Aleve®)
▪ Bufferin®	

No use medicamentos para el resfriado o la sinusitis, laxantes y antiácidos que contengan aspirina o antiinflamatorios no esteroideos.

Sangrado y qué hacer si sangra

El rivaroxabán puede aumentar su riesgo de sangrado y hematomas. Tenga cuidado cuando realice actividades que puedan ocasionar lesiones, un corte o un hematoma.

- Informe a su médico si se cae, se golpea el cuerpo o la cabeza o sobre cualquier otra lesión.
- Coloque una alfombra de baño antideslizante en la tina para evitar accidentes.
- Tenga cuidado de no cortarse. Eso incluye tener un cuidado especial al cepillarse los dientes y al afeitarse. Use un cepillo de dientes blando y seda dental con cuidado. Use una rasuradora eléctrica, en lugar de una afeitadora manual con hojas de afeitar.
- Si se corta, aplique presión sobre el área durante 5 minutos para asegurarse de detener el sangrado.
- Es importante que porte una identificación, como un brazalete de alerta médica, indicando que toma rivaroxabán. Esto puede ayudarlo a recibir un tratamiento adecuado en caso de una emergencia.

Cuándo debe llamar al médico

Llame a su médico de inmediato o diríjase a un departamento de emergencias si ocurre algo de lo siguiente:

Señales de sangrado:

- Sangrado incontrolable por cortes o heridas
- Hemorragia nasal que ocurre a menudo o incontrolable
- Tos con sangre
- Orina roja, rosada o marrón
- Vómito con sangre o que parece granos de café
- Heces rojas brillantes o negras que parecen brea (si no está tomando suplementos de hierro)
- Sangrado excesivo en las encías o incontrolable
- Moretones anormales o cambios en el color de la piel que aumenta o que no mejora con el tiempo
- Mareos o desmayos
- Malestar estomacal o intestinal
- Dolores de cabeza que no se van
- Sangrado menstrual abundante que es incluso más abundante de lo usual

Señales de coágulos:

- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Mareos
- Falta de aire
- Hinchazón o enrojecimiento en las piernas o los brazos
- Dolor cuando camina, o dolor y calor en brazos o piernas

Haga preguntas para asegurarse de entender qué cantidad de rivaroxabán debe tomar y cuándo tomarlo. Llame al médico si tiene preguntas.